



中山醫療社團法人中山醫院
CHUNG SHAN HOSPITAL

用藥指導單張

成份	中文商品名 英文商品名	含量 mg/錠
Warfarin	歐服寧錠 Orfarin	3、5

Warfarin 抗凝血劑

本單資訊並無法代表該藥品的全部資訊如
您有任何疑問請詢問醫師或藥師

疑問諮詢請電

(02)27081166 轉 1073

中山醫療社團法人中山醫院
藥劑科臨床藥學組製

【作用】

抗凝血劑，藉由抑制會導致血栓物質之形成而延遲血液之凝固，可用來預防或治療血栓之形成。

【服藥指示】

按醫師指示服用，通常隔日一次，於當日同一時間投與。

【忘記服藥時該怎麼辦？】

想起來時應儘快補服，但如果第二天才想到只需服用當天醫師指定的藥量即可，請不要一次服用兩天份的藥量(因為容易造成出血)。

【注意事項】

1. 若須進行牙科檢查、拔牙或任何手術時，必須告知醫師正服用此藥。
2. 請勿增加或減少攝取含維生素K之食物，如動物肝臟、綠色蔬菜、花椰菜等(見附表)。
3. 許多藥物會增加或減少本藥的藥效，勿隨意購買服用(見附表)。
4. 請限制含有酒精飲料的攝取。
5. 用藥期間遵照醫師指示定期監測PT(凝血酶原時間)或INR(國際標準化凝血酶原時間比值)。

1. 請勿自行更換不同廠牌的藥品。
2. 連續多日天氣炎熱時須小心，因本藥的抗凝血作用會增強。
3. 藥物置於室溫下貯存，勿放於冰箱中，以免影響藥效。

【藥物相關之副作用及建議處置】

1. 若出現下列情形應盡速就醫：
如不正常之瘀青或出血、血尿、血便、眼球、腸胃道、鼻子或痰液不正常出血、紅疹甚至皮膚壞死等情形。
2. 若下列症狀持續或較嚴重請告知醫師：
噁心、嘔吐、食慾降低、腹瀉、掉髮、皮膚癢、喉嚨痛、嘴痛手腳麻木或刺痛、臉部麻痺、突然無力。

富含維生素K之食物將減弱藥效	
水果	蘋果、香蕉、橘子、草莓。
肉類及其製品	牛肝、豬肝、雞肝、煙燻豬肉。
蔬菜類	青花椰菜、甘藍、花椰菜、包心菜、蘆筍。
飲料	綠茶、咖啡
穀類	燕麥

增強藥物作用之藥物(造成異常出血)

Bokey (Aspirin)、Ponstan(Mefenamic acid)、Idofen(Ibuprofen)、Keto(Ketorolac)、Baktar、Relifex(Nabumetone)、Eltroxin(Thyroxine)、Celebrex(Celecoxib)、Quinidine、Baccidal(Norfloxacin)、Cravit(Levofloxacin)、Ciproxin(Ciprofloxacin)、Tetracycline Cordarone(Amiodarone)、Voren(Diclofenac)、Klaricid(Clarithromycin)、Ladogal(Danazol)、Diflucan(Fluconazole)、Lopid(Gemfibrozil)、Salazopyrin EN(Sulfasalazine)、Nizoral(Ketoconazole)、Defense(Cimetidine)、Sulfin(Sulfinpyrazone)、Sporanox(Itraconazole)、Zithromax(Azithromycin)、Frothin(Metronidazole)、Lipanthyl Supra(Fenofibrate)、

減弱藥物作用之藥物(造成異常凝血)

Luminal(Phenobarbital)、維他命K

並非所有的交互作用都是顯著而需要立即處理的，若有併服上列用藥請主動告知醫師。