



## 用藥指導單張

### 新型抗凝血藥物

成份	中文商品名 英文商品名	含量 mg/錠
Rivaroxaban	拜瑞妥膜衣錠 Xarelto	10、15
Dabigatran	普栓達膠囊 Pradaxa	110、150
Apixaban	艾必克凝膜衣錠 Eliquis	2.5、5
Edoxaban	里先安膜衣錠 LIXiana	60

本單資訊並無法代表該藥品的全部資訊如  
您有任何疑問請詢問醫師或藥師

疑問諮詢請電

(02)27081166 轉 1073

中山醫療社團法人中山醫院  
藥劑科臨床藥學組製

## 【作用】

抗凝血劑，防止血栓形成。

## 【服藥指示】

1. 請勿在未告知醫師的情況下停藥，冒然停用此類藥物可能會增加血液凝塊的風險，不可因為沒有不舒服的症狀而自行停藥，請仔細遵照醫師指示服用。
2. 是否與食物同時服用均可，儘可能保持每日於相同時間服用。
3. Pradaxa(普栓達膠囊)：須整片吞服。請勿咀嚼、咬開或碾碎。

## 【忘記服藥時該怎麼辦？】

請儘快補服；但若已很接近下次的服藥時間時，請在下次正確服藥時間再服藥；請注意：切勿在同一時間或短時間內重複服用兩次劑量!!

## 【注意事項】

1. 曾經對此類藥物或賦形劑過敏者不應使用。

2. 如有懷孕、計劃懷孕或正以母乳餵哺幼兒的婦女一定要告知醫師。
3. 任何手術或拔牙前請告知醫生或牙醫師正在服用本類藥品。
4. 進行血液檢驗。請告知醫療人員。
5. 此藥可能增大出血風險，小心避免受傷、跌倒及小心使用軟毛牙刷和電動剃鬚刀。
6. 一般手術及介入性治療，則應於該治療前1~2天停用；若肝腎功能甚差者(Crcl<50mL/分鐘)或進行重大手術、脊椎穿刺，停用3~5天(以上)，實際停藥天數請遵照醫囑。
7. 患有嚴重的腎臟疾病或腎臟功能不佳者、肝功能不佳者，請告知醫生。
8. 若出現呼吸緩慢、薄弱或困難的問題，請立刻聯絡您的醫生。

## 【藥物相關之副作用及建議處置】

1. 所有藥物皆可能引起副作用。但有許多人沒有副作用，或是只有輕微的副作用。若您出現任何令您困擾或不會消退的副作用，請告知您的醫師或接受醫療協助。
2. 此藥可能增大出血風險，曾有消化性潰瘍病史或使用其他抗凝血劑、抗血小板藥物、消炎止痛藥者，或是相關出血癥兆者

如：牙齦滲血、皮膚瘀青、血尿等，請告知醫生。

3. 常見副作用：貧血、消化不良、胃腸道出血、頭暈、頭痛、鼻出血。
4. 此衛教單張並未涵蓋所有可能發生的副作用若您對副作用有疑問，請聯絡醫師或藥師以取得關於藥品資訊說明書。

## 【藥品儲存指示】

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
2. Pradaxa(普栓達膠囊)應保存在包裝中，不要剝除鋁箔放到專門放藥片的容器中。
3. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。