

用藥指導單張

口服降血糖藥物

硫醯基尿素類 Sulfonylureas

| 成份 | 中文商品名 英文商品名 | 含量 mg/錠 |
|---------------|-----------------------|------------|
| Glimepiride | 瑪爾胰錠 Amaryl | 2 |
| Gliclazide | 岱蜜克龍錠 Diamicron MR | 30 |
| Glibenclamide | 固利康 Gliben | 5 |
| Glipizide | 減糖尿錠 Minidiab | 5 |

本單資訊並無法代表該藥品的全部資訊如
您有任何疑問請詢問醫師或藥師

疑問諮詢請電

(02)27081166 轉 1073

中山醫療社團法人中山醫院
藥劑科臨床藥學組製

【作用】

用於非胰島素依賴型(NIDDM)，即成人型或第二型糖尿病病人，以增加體內胰島素的分泌降低血糖。

【服藥指示】

1. 糖尿病無法根治，但高血糖會引起腎臟，眼睛及心血管病變；故需要長期良好的控制，請按照醫師指示服藥，不可因為沒有不舒服的症狀而自行停藥
2. 儘可能保持每日於相同時間服用。

【忘記服藥時該怎麼辦？】

請儘快補服；但若已很接近下次的服藥時間時，請在下次正確服藥時間再服藥；請注意：切勿在同一時間或短時間內重複服用兩次劑量!!

【注意事項】

1. 定期檢查血糖、糖化血紅素、尿糖、腎功能檢查，作為醫師了解血糖控制情形及必要時作劑量調整的參考。
2. 如有懷孕、授乳及腎、肝、心臟、甲狀腺、嚴重感染、內分泌等疾病或服用其他藥物應告知醫師。
3. 服藥期間應避免過度日曬並應採取適當的防曬措施(如使用洋傘、穿著防曬外套或帽子、塗抹防曬用品等)避免皮膚曬傷或發生光感性反應

4. 因飲酒會引起低血糖，或引起胃痛、噁心、嘔吐、頭痛、冒汗等反應，故服藥期間避免飲酒過量
5. 當感冒或發燒時，應正常服用本藥，若無法進食，應以純果汁 200cc 代替一餐，以避免低血糖。

【藥物相關之副作用及建議處置】

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：頭暈、輕微嘔吐或噁心。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
2. 如有皮膚發疹、發癢、發紅、嚴重晒傷；皮膚或眼睛變黃，大便顏色變淡、尿色變深；不正常出血、瘀血；喉嚨痛、持續發燒。請立即就診告知醫師。
3. 若有以下**高血糖**症狀：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、身體虛弱、呼吸困難、心跳加快、皮膚乾燥、反應遲鈍，請立刻聯絡您的醫師以調整劑量或飲食。
4. 若有以下**低血糖**症狀：不尋常的飢餓感、無力感、顫抖、心跳加快、冒冷汗、視力模糊、精神意志不易集中，應立刻補充果汁 200cc 或糖果 2-4 顆。如未見改善，則應送急診。

5. 嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時，則不可進食應立即送急診。
6. 高低血糖症狀有時不易分辨，可先測血糖再決定是否需要補充果汁或糖果。若常有高低血糖發生，請告知你的醫師。

【藥品儲存指示】

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
2. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。