

用藥指導單張

口服降血糖藥物

Biguanide

成份	商品名中文/英文	含量 mg/錠
Metformin	寬樂醣 Metformin	500
Metformin	庫魯化錠 Glucophage	850
Metformin ER	新福胰持續釋放 Metformin ER	500mg

α -Glucosidase inhibitor

成份	中文商品名 英文商品名	含量 mg/錠
Acarbose	醣祿錠 Glucobay	50

本單資訊並無法代表該藥品的全部資訊如
您有任何疑問請詢問醫師或藥師

疑問諮詢請電

(02)27081166 轉 1073

中山醫療社團法人中山醫院
藥劑科臨床藥學組製

【作用】

1. Metformin：加強胰島素的作用，以降低血糖。

2. Acarbose：使食物消化釋放葡萄糖到你血中的作用變慢。減慢食物的消化，血糖在飯後不會升得很高

【服藥指示】

1. 糖尿病無法根治，但高血糖會引起腎臟，眼睛及心血管病變；故需要長期良好的控制，請按照醫師指示服藥，不可因為沒有不舒服的症狀而自行停藥
2. 隨餐服用，可減少胃腸方面，如腹瀉、噁心、嘔吐、脹氣等副作用。
3. 保持每日於相同時間服用。

【忘記服藥時該怎麼辦？】

請儘快補服；但若已很接近下次的服藥時間時，請在下次正確服藥時間再服藥；請注意：切勿在同一時間或短時間內重複服用兩次劑量!!

【注意事項】

1. 請定期檢查血糖、糖化血紅素、尿糖、腎功能檢查，作為醫師了解血糖控制情形及必要時作劑量調整的參考。
2. 因飲酒會引起低血糖，或引起胃痛、噁心、嘔吐、頭痛、冒汗等反應，故服藥期間避免飲酒過量
3. 如有懷孕、授乳及腎、肝、心臟、甲狀腺、嚴重感染、內分泌等疾病或服用其他藥物請告知醫師。
4. 手術或需要顯影劑造影檢查應事先告知醫師您正服用本藥。

【藥物相關之副作用及建議處置】

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情況，請勿太驚慌：初期發生之胃腸不適，可由較低劑量逐漸增加用量或隨餐服用而減輕不舒服感，通常連續服用後不適症狀會消失，但如果有嚴重腹瀉或嘔吐，則需暫時停藥。
2. 服藥一段時間後，若發生胃腸不適、不明

之換氣過度、肌肉疼痛、不適或異常嗜眠等症狀應立即停藥並就醫。

3. Metformin：乳酸血症極少發生但為極嚴重之副作用。於腎或肝功能不佳、缺氧、飲酒過度、脫水等病人較易發生，故這些病人應停藥或避免用此藥。

4. 若有以下**高血糖**症狀：頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、腹痛、身體虛弱、呼吸困難、心跳加快、皮膚乾燥、反應遲鈍，請立刻聯絡您的醫師調整劑量或飲食。

【藥品儲存指示】

1. 藥品請置於室溫保存，避免存放於高溫或潮濕處。
2. 請將藥品置於幼兒不易拿取之處所，以免幼兒誤服。