



中山醫療社團法人中山醫院  
CHUNG SHAN HOSPITAL

## 用藥指導單張

### 小兒用藥 注意事項

本單資訊並無法代表該藥品的全部資訊如  
您有任何疑問請詢問醫師或藥師

疑問諮詢請電

(02)27081166 轉 1073

中山醫療社團法人中山醫院  
藥劑科臨床藥學組製

## 【注意事項】

1. 稀釋過後的藥水請冷藏保存，使用前請搖勻。
2. 必要時，可用湯匙將錠劑藥品壓成粉末後服用。
3. 膠囊若無法吞服，可撥開膠囊將其中的藥粉以開水吞服。
4. 服用前再分包以防潮解。
5. 使用抗生素請務必遵照醫師指示服完療程，不可擅自停藥。
6. 用法為每 8 小時一次或每 6 小時一次時，建議爸媽可以考慮早上剛睡醒時讓寶寶先吃一次、晚上睡前再吃一次，其餘一或二次則平均分配在白天裡。

例如：早上 7 點起床、晚上 10 點睡覺各吃一次，若是一天 3 次的用藥，可在下午 2 點半左右吃一次；若是一天 4 次的用藥，可在中午 12 點及下午 5 點左右各吃一次。

7. 假如寶寶在餵完藥的 10 分鐘內就吐了，建議再補服一次劑量；若已過了半小時，藥物可能大部份已經被吸收了，就不建議再補服。

8. 藥品不建議在嬰幼兒配方奶中餵食，因為溫度可能會破壞藥品的藥效，並造成延緩吸收。萬一寶寶沒有乖乖喝完牛奶，藥就沒有吃完，療效也會打折扣。
9. 藥水劑量小，建議家長自行至社區藥局購買小兒專用餵藥器，劑量較為精準，也方便家長餵藥。
10. 寶寶耳溫超過 38°C 時可口服退燒藥水，四小時後仍未退燒，可依醫師指示劑量再給寶寶服用退燒藥水即可，或耳溫超過 39°C 時可使用退燒栓劑
11. 但請勿兩者同時使用，如有需要，兩者需間隔 2 小時使用，也就是說使用過其中一種，二小時後才能使用另一種。


## 【可能的副作用；該如何處理？】

1. 任何一種藥物都有副作用，所有的副作用並不是會發生在每個人身上，而是因各人體質不同而有所不同。
2. 但如果寶寶吃藥有任何異常的反應，請即刻洽詢醫師或藥師。一旦確定是藥物引起的副作用，家長請紀錄以下訊息：藥物名稱、使用的劑量，及副作用產生的反應為何，並在每次就醫時主動告訴醫師，以免寶寶再次受到傷害。

## 【栓劑】

### 【使用方法】

1. 將雙手洗淨，並用乾淨之紙巾將雙手擦乾。
2. 將塞劑的外膜撕開。
3. 側身躺於床上。將塞劑尖端部份朝前，以食指將塞劑塞入肛門約 1-2 節深。



### 【注意事項】

1. 使用後，如發生過敏或不適的現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並立即請教醫師或藥師。
2. 栓劑僅供外用，切勿吞服
3. 請遵照醫囑需要時使用。