

鼻腔定量噴液劑使用說明

• 第一次用藥時



第一次用藥前，充分搖動藥瓶並對空噴壓藥劑數次（5-10次），以確保噴出之藥霧量均一（如圖）。



此一步驟可維持噴霧均一性約 24 小時，如果到下次使用前的時間超過 24 小時，使用前請再重複上述動作，惟只需對空噴壓一次即可。

**Pulmicort Nasal Aqua**

- 治療過敏性鼻炎
- 成人及大於 6 歲之兒童：  
一天一次，早晨每個鼻孔各兩噴。



適應症季節性及經年性過敏鼻炎、血管性鼻炎及治療鼻息肉的相關症狀。劑量及給藥法在早晨每個鼻孔 128mcg (2x64mcg) 或在早、晚每個鼻孔各投予 64mcg。每日劑量超過 256mcg，並不會有更進一步的效果。禁忌對本藥任何成份有過敏之病史者。特殊警告及注意事項以高劑量長期治療時，可能會發生全身性類固醇作用。鼻腔有菌叢或黴菌感染的患者，使用本藥治療時須謹慎。Budesonide 口服後之藥物動力學，會因肝功能不良而受影響，此可由其排除速率降低及全身性可用率增加得到證實。必須考慮可能造成的全身性不良反應。對肺結核之患者可能需特別仔細評估。Pulmicort Nasal Aqua 不可和眼睛接觸，若不慎接觸到眼睛，請立即以水沖洗。應避免與 ketoconazole 或其他強效之 CYP3A4 抑制劑併用。若無法避免時，則兩者給藥之時間間隔，越長越好。常見副作用局部刺激、輕微血樣鼻分泌物、鼻出血。（詳細仿單資料備索）

AstraZeneca 台北市敦化南路二段 207 號 21 樓  
電話：(02) 2378-2390 傳真：(02) 2377-0914  
http://www.astrazeneca.com.tw  
臺灣阿斯特捷利康股份有限公司

本使用指南為臺灣阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 公司提供已處方能舒鼻使用之病患衛教使用，並無法取代專業醫療。如對疾病或藥物的使用或相關資訊，請諮詢您的醫療專業醫師或衛教師。

356.909.022\_PUL\_13/02/2015

• 平常用藥時



1. 擤鼻。



2. 搖動藥瓶。



3. 移動瓶蓋。



4. 以圖示姿勢握住藥瓶。



5. 用拇指壓住一邊鼻孔，將噴頭插入鼻孔，頭稍向前傾，開始用鼻吸氣。吸氣時用手按壓噴嘴，使之噴出指定劑量的氣霧。



6. 用口呼氣；如須第二噴，請重複步驟 5、6，吸入第二次噴劑。



7. 換手，並在另一邊鼻孔重複整個程序。



• 用藥後  
8. 用乾淨的紙巾或手帕抹乾噴嘴，套回蓋子。