

## 一、常見靜脈注射原因：

1. 發燒。
2. 嘔吐及腹瀉情形。
3. 飲食困難。
4. 電解質不平衡。

## 二、治療目的：

1. 依醫囑給予抗生素藥物治療或輸血。
2. 紿予足夠的水份、電解質及營養。
3. 觀察並記錄患童病情變化，以及早發現合併症。



## 三、護理指導：

1. 保持針頭固定處清潔，預防感染。
2. 勿用力拉扯點滴或固定處，以防止針頭移位或滑脫。
3. 勿壓迫或扭曲點滴管，維持點滴的流暢。
4. 抱起孩童請注意：注射部位勿超過點滴流速控制器及點滴瓶（打針的手放低）。
5. 點滴瓶外護理師會貼上時刻標示，請協助觀察是否會相差太多。
6. 護理師交接班及做護理時，會觀察注射部位及流速的正確性，請給予協助。
7. 勿自行調整滴數，以免因滴數太慢或太快造成心臟負荷或管路阻塞。

## 四、注意事項： (若有下列情況請告知醫護人員)

1. 針頭部位滲血或漏水。
2. 注射部位有紅、腫、熱、痛及脹現象。
3. 點滴不滴時。
4. 點滴瓶內輸液即將滴空時。
5. 針頭滑脫。



注射部位異常：  
紅、腫、熱、痛及脹現象。

圖片來源：高雄醫學大學附設中和紀念醫院



小兒點滴護理指導單



如對護理衛教有問題請洽詢  
中山醫療社團法人中山醫院  
地址：臺北市仁愛路四段 112 巷 11 號  
電話：(02)2708-1166

102.06 製、114.07 檢

現代醫療 傳統照顧