



兔唇、顎裂之護理指導

一. 什麼是兔唇顎裂？

面部缺陷中較常見的一種，因胚胎時，面部兩側組織結合未完全而引起。可能是偶發性的，也可能與遺傳、病毒感染、藥用、放射線照射、營養不均衡等因素相關。



兔唇



唇顎裂

二. 護理指導：

1. 使用較軟、長的、孔洞大的顎裂專用奶嘴和滴管、湯匙或小杯緩慢餵食，勿使用一般的奶嘴。
2. 餵食時，將嬰兒抱成直立姿勢，頭胸部輕微後仰，以利吞嚥，預防吸入性肺炎。

3. 易吸入大量空氣，故須經常排氣，注意觀察是否有嗆到、發紺、腹脹等現象。
4. 塑膠滴管需放於口腔的後面或臉頰內側面，以少量多次的方法慢慢注入餵食，以減少由鼻腔回流。
5. 餵食後予清水清潔口腔，可減少感染的機會。
6. 通常在 6-12 週，體重 4.5kg 以上時，行兔唇修補術；顎裂於一歲半，體重 9.1kg 以上為最適宜，以免影響幼兒語言發展及下顎發育。

如對護理指導有問題請洽詢

中山醫療社團法人中山醫院

地址：臺北市仁愛路四段 112 巷 11 號

電話：(02)2708-1166 # 2220

圖片摘自網路

95.04 制、112.05 檢

現代醫療，傳統照顧