

## A、Alasan umum untuk injeksi intavenous :

1. Demam.
2. Muntahan dan diarekasus.
3. Makan kesulitan.
4. Ketidakseimbangan elektrolit

## B、Tujuan terapeutik

1. Dengan perintah diberikan obat antibiotic atau transfuse darah.
2. Mengingat cukup elektrolit dan nutrisiair.
3. Anak-anak dengan perubahan kondisi yang diamati dan direkam, Dan detksi dini komplikasi.

## C、Perawatan panduan

1. Tetap bersih untuk mencegah infeksi pada jarum tetap.
2. Jangan menarik jarum untuk mencegah tetesan atau memaksakan perpindahan tetap atau selip.

3. Janganlah menindas atau mendistorsi drip tabung infuse untuk menjaga kelancaran.

4. Harap dicatat bahwa anak-anak di jemput : jangan melebihi situs pengendali laju alir injeksi dan botol tetes tetes ( suntikan tangan rendah ).

5. Botol drip ditaati saat tolong bantu mengamati apakah perbedaan ditandai juga.

6. Akan diamati di tempat suntikan dan laju alir kebenaran pergeseran dan peduli bantuan perawat silakan.

7. Jangan mencoba untuk menyesuaikan jumlah tetes tetes sehingga untuk menghindari menyebabkan pipa beban jantung cepat ayau terlalu lambat atau diblokir drip.

## D、Kewaspadaan :

(Harap memberitahu perawat jika kondisi berikut)

1. Situs jarum perdarahan atau bocor.
2. Tempat suntikan Rad、Bengkak、Panas、Sakit dan fenomena pembengakkan.
3. Bila tidak menetes tetes.
4. Saat hendak menetes botol infuse kosong.
5. Jarum slip.



# Pediatric Instruksi Keperawatan Tunggal Drip

如對護理指導有問題請洽詢  
中山醫療社團法人中山醫院  
地址：臺北市仁愛路四段 112 巷 11 號  
電話：(02)2708-1166  
103.06 制、114.07 檢

現代醫療，傳統照顧